A.10

Digitized by the Internet Archive
in 2017 with funding from
Wellcome Library

https://archive.org/details/b29300198

J. A. Molinari (1943) described this Bs. from A. Zinny (1875) as an reprint of 1819.

DESCRIPCION

QUE HACE EL

DOCTOR PINEL

Miembro del Instituto real y de la legion de honor, profesor en la escuela de medicina de Paris, médico en gefe del hospicio de la Salpetriere &c.

SOBRE

LA

VARICELE.

HAY una inflamacion pustulosa de la piel que se ha confundido frecuente- „ mente con la viruela, y este error ha contribuido á retardar los progresos de la „ inoculacion. Esta afeccion es la varicéle ó viruela falsa, y fue descubierta en el „ siglo 16, y puede ser que aun anteriormente. Antes que la vacunacion fuese cono- „ cida en Europa, se habian dado ya descripciones proprias para distinguirla de la „ viruela maligna ó de la verdadera viruela. Zinguer médico de Basiléa la ha descripto „ segun la epidémia que observó durante la primavera de 1712; Maret de Djon, „ Cullen y otros la han distinguido tambien de la viruela. Dezoteux y Mr. Valentin „ han dado muy particularmente una descripcion extensa de ella en el tratado de „ la inoculacion."

" Se distingue la varicéle que los médicos ingleses llaman *Chicken pox* (pustulas „ de pollo) y *Swine pox* (pustulas del chancho) en que en la primera los botones son „ poco elevados, muy pequeños, y contienen un humor absolutamente claro y sin „ color. En la segunda los botones son mas gruesos y mas llenos, contienen tambien „ un líquido mas espezo, que blanquea y se acerca mas á verdadero pus. Esta última „ es la que puede confundirse con la viruela, por que en algunos casos se deja ver „ una areola en la base de las pustulas, pero no tienen la forma cónica, sino que „ se acercan mas á la esférica, y no á la lenticular, mas largas en el cuerpo que en la „ base, y mas blandas. Tampoco se apercibe en el centro ese punto obscuro, y cierta „ deprecion que son señales características de la viruela lejítima. La disecacion se ve- „ rifica mas tarde; las pustulas al secarse forman una película, cuya caida deja una „ mancha en el cutis menos viva que en la viruela, y algunas veces deja tambien se- „ ñales.—PINEL NOSOGRAFIA tom. 2°. pág. 52. §. 49 y 50."

La publica el Dr. Segurola

DESCRIPCION

QUE HACE EL

DOCTOR PINEL,

Miembro del Instituto real y de la legion de honor,
profesor en la escuela de medicina de Paris,
medico en gefe del hospicio de la Salpetriere &c.

SOBRE

LA

VARICELA.

HAY una inflamacion pustulosa de la piel que se ha confundido frecuentemente con la viruela, y este error ha contribuido á retardar los progresos de la inoculacion. Esta afeccion es la varicèle ó viruela falsa, y fue descubierta en el siglo 18, y puede ser que aun anteriormente. Antes que la vacunacion fuese conocida en Europa, se habian dado ya descripciones propias para distinguirla de la viruela maligna ó de la verdadera viruela. Ningun médico de Basilea la ha descripto segun la epidémia que observó durante la primavera de 1712; Mauet de Dijon, Cullen y otros la han distinguido tambien de la viruela. Desoteux y Mr. Valentin han dado muy particularmente una descripcion extensa de ella en el tratado de la inoculacion."

"Se distingue la varicèle que los médicos ingleses llaman Chickenpox (pustulas de pollo) y Swine pox (pustulas del chanchlo) en que en la primera los botones son poco elevados, muy pequeños, y contienen un humor absolutamente claro y sin color. En la segunda los botones son mas gruesos y mas llenos, contienen tambien un liquido mas espeso, que blanquea y se acerca mas á verdadero pus. Esta última es la que puede confundirse con la viruela, por que en algunos casos se deja ver una areola en la base de las pustulas, pero no tienen la forma cónica, sino que se acercan mas á la esférica, y no á la lenticular, mas largas en el cuerpo que en la base, y mas blandas. Tampoco se aperciibe en el centro ese punto obscuro, y cierta depresion que son señales características de la viruela legítima. La diseccion se verifica mas tarde; las pustulas al secarse forman una pelicula, cuya caida deja una mancha en el cutis menos viva que en la viruela, y algunas veces deja tambien pequeñas."

"Biles.—Pinel Nosografia tom. 2°. pág. 61 §. 40 y 50."

La publica el Dr. Segurola